



AVERTISSEMENTS AGRICOLES téléimprimés

EDITION GRANDES CULTURES

STATION
POITOU-CHARENTES

Bulletin n° 218-2 (12/92) du 11 Juin 1992

TOURNESOL		: Attention au risque Sclérotinia
MAIS,	Sésamie	: Vol sur le sud de la région
	Pyrale	: Premières nymphoses début Juin.

TOURNESOL

Stade : B 4 à B 10.

PUCERONS

Situation
Populations faibles.

Préconisation
Interventions actuelles non justifiées, plus d'intervention après le stade bouton étoilé.

SCLEROTINIA DU BOURGEON TERMINAL

Situation
Pas d'attaques observées pour l'instant, le climat est très favorable à cette maladie.

Préconisation
Les variétés très sensibles, cultivées dans les zones à risque, ont dû être protégées (bulletin n° 218).
Les variétés intermédiaires cultivées dans les zones à risque doivent être protégées rapidement, avant apparition des symptômes.
Plus d'intervention après le stade E 1.

MAIS

Stade : la majorité des parcelles sont arrivées au stade 10 feuilles.

SESAMIE

Situation
Le vol s'est intensifié dans les derniers jours du mois de Mai et les premiers jours du mois de Juin sur le sud de la région.

Préconisation
Dans les zones à risque, les préconisations du bulletin téléimprimé n° 218-1 du 22 Mai 1992 sont toujours valables.
* **Arrivée au stade "2 feuilles" après le 10 Juin** :
Ne pas intervenir en première génération ;
Surveiller la seconde génération sur ces maïs.

PYRALE

Situation
La situation en cage d'élevage est la suivante : 11 % de nymphose au 4 Juin 1992 à la Protection des Végétaux de Biard.


Prévision - Préconisation
Le vol sera suivi en cage d'élevage et dans les zones à risques par pièges sexuels.
Les dates de traitement dans les zones à risques seront données dans les prochains bulletins.

Une intervention n'est pas justifiée à l'heure actuelle que ce soit sur maïs tardifs ou précoces.



Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt
SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX
13, Rte de la forêt - 86580 BIARD
Abonnement annuel: 300 F. Tél.: 49.58.39.02

Publication périodique
Directeur Gérant: J.P. PIQUEMAL
CPPAP no. 1664 A.D.
ISSN 0294 - 4693



PUCERONS

Situation
On observe des débuts de colonisations de pucerons dans les parcelles de la région. Seul **Metopolophium dirhodum** peut être nuisible au stade précoce du maïs.

Préconisation

Nous rappelons les seuils :
Avant le stade 8 feuilles : 10 *Metopolophium dirhodum* par plante ;
Après le stade 8 feuilles : 200 *Metopolophium dirhodum* par plante.

NOCTUELLES TERRICOLES

Situation
Des dégâts de noctuelles sont signalés dans les zones humides (marais) et principalement sur les semis tardifs.

Préconisation
Un traitement avec une pyréthrine est conseillé en cas de forte infestation Traiter de préférence le soir oú très tôt le matin à 800 ou 1000 l d'eau/ha.

COLZA

Stade : G4 (10 premières siliques bosselées) à G 5 (grains colorés).

INSECTES

Fin des interventions.

MALADIES

Fin des interventions.

POIS

Stade : grossissement des gousses à début maturation.

PUCERONS

Situation
Stabilisation, voire régression des populations.

Préconisation
Plus d'intervention.

MALADIES

Situation
Les précipitations sont favorables à l'anthracnose et au botrytis.

Préconisation
Lorsque toutes les gousses sont pleines, il n'est plus nécessaire d'intervenir. Les pois les plus tardifs (gousses plates), n'ayant pas reçus de fongicides, peuvent cependant être protégés en visant particulièrement l'anthracnose.

BLE

Stade : grain laiteux à grain pateux.

PUCERONS

Situation
Les populations ne progressent plus, les seuils ne sont pas atteints.

Préconisation
Risque actuel faible, après le stade grain laiteux : plus d'intervention.

MALADIES

Plus d'intervention maintenant.



Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt
SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX
13, Rte de la forêt - 86580 BIARD
Abonnement annuel : 300 F. Tél.: 49.58.39.02

Publication périodique
Directeur Gérant: J.P. PIQUEMAL
CPPAP no. 1664 A.D.
ISSN 0294 - 4693

P19